


CE QU'IL NE FAUT PAS FAIRE



Ne mettez pas le produit en bouche



N'utilisez pas d'autre pansement que celui fourni avec l'Emla®



N'étalez pas la crème avant de mettre le pansement



Afin d'éviter les fuites, ne faites pas dépasser le pansement sur les doigts

Contre-indications pour le patch et la crème :

- En cas d'allergie connue aux anesthésiques locaux
- En dessous de 3 mois, demandez l'avis du pédiatre.

Précautions particulières d'emploi pour la crème :

- **Prématuré entre 30 et 37 semaines :** une noisette (0,5 g) à un seul endroit et une fois par jour, une heure maximum de pose
- **Nouveau-né jusqu'à 3 mois :** noisette de 0,5 g à 1 g max., 1x/12h, une heure maximum de pose
- **De 3 mois à 1 an :** noisette de 0,5 g à 1 g max., 2 g/jour maximum, 1h30 de pose
- **Plus d'1 an :** noisette de 1 g à 2 g max., 10 g/jour maximum, 1h30 de pose

VOUS VOUS POSEZ D'AUTRES QUESTIONS SUR LA DOULEUR DE VOTRE ENFANT ?

www.pediadol.org • www.sparadrap.org

Cette brochure a été élaborée par l'équipe douleur pédiatrique du Groupe santé CHC
Clinique CHC MontLégia - bd Patience et Beaujonc 2 - B-4000 Liège



HÔPITAL
MÈME PAS MAL

CHC
GROUPE SANTÉ



HÔPITAL
MÈME PAS MAL

CHC
GROUPE SANTÉ

POUR UNE PIQÛRE SÈREINE ET SANS DOULEUR

Application de l'Emla® en patch ou en crème

Emla® est indiqué dans la prévention de la douleur lors d'une piqûre programmée chez votre enfant.

Le produit existe en patch ou en crème et est disponible en pharmacie, sur prescription médicale. Le choix de la formule et de l'endroit où il devra être appliqué sera déterminé par le médecin et/ou l'infirmier(ère).


Voici quelques conseils pour utiliser le produit dans les meilleures conditions.



APPLICATION DE L'EMLA® EN PATCH



Laissez agir **1 heure minimum**
Retirez **10 minutes** avant la prise de sang



1

Ouvrez le patch



2

Placez la partie imprégnée de crème
sur une veine du pli du bras ou au dos de la main
(du côté gauche ou droit)



3

Appuyez fermement sur le
pourtour du patch pour qu'il
adhère parfaitement à la peau



4

Entourez le patch avec
un bandage ou un vê-
tement long pour éviter
les fuites et l'ingestion

APPLICATION DE L'EMLA® EN CRÈME



Laissez agir **1 heure minimum**
Retirez **10 minutes** avant la prise de sang



1

Préparez le pansement en retirant le film plastique
puis en décollant le support papier de la partie centrale



2


Percez le tube de crème avec le dos du bouchon



3


Pour une prise de sang,
déposez la crème,
du côté gauche ou droit :
sur une veine, à 2
endroits différents
du pli du bras ou
sur le dos de la main

Suivant les indications
données par le médecin
et/ou l'infirmier(ère)



4

Décolliez le support papier du pansement
et placez la partie autocollante sur la
peau, en veillant à bien centrer la crème



5

Appuyez fermement
sur le pourtour du pansement
pour qu'il adhère
parfaitement à la peau



6

Retirez le contour cartonné



7

Entourez le pansement avec
un bandage ou un vêtement
long pour éviter les fuites
et l'ingestion



RETROUVEZ LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION AU VERSO DE CE DÉPLIANT